

Standardna pogreška Interval pouzdanosti

doc. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, specijalist medicinske biokemije

Klinički zavod za kemiju, Odjel za molekularnu dijagnostiku
Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", Zagreb



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika


PONOVIMO: deskriptivna analiza

- Mjere središnjice
 - aritmetička sredina
 - medijan (centralna vrijednost)
 - mod (najučestalija vrijednost)
- Mjere rasapa
 - raspon
 - standardna devijacija



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

PONOVIMO: normalna raspodjela



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA



1. Što je deskriptivna analiza?
2. Što su mjere središnjice i rasapa?
3. Definirajte aritmetičku sredinu, mod i medijan.
4. Definirajte standardnu devijaciju.
5. Što je raspon? Što je interkvartilni raspon?
6. Koje su osobine normalne raspodjele?
7. Koliko je vrijednosti nekog skupa podataka obuhvaćeno s dvije standardne devijacije?
8. U kojem su odnosu aritmetička sredina, mod i medijan u normalnoj raspodjeli?
9. U kojem su odnosu aritmetička sredina, mod i medijan u asimetričnoj raspodjeli?
10. Što je standardna normalna raspodjela?



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

Primjer:



Pretpostavke:


- visina studenata 1. godine u Hrvatskoj slijedi normalnu raspodjelu
- prosječna visina je 172 cm, a standardna devijacija je 4 cm.

Kolika je vjerojatnost da potpuno slučajnim izborom odaberemo studenta koji je viši od 176 cm?



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

Vjerojatnost da potpuno slučajnim izborom odaberemo studenta koji je viši od 176 cm je:



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

Primjer:



Pretpostavke:


- visina studenata 1. godine u Hrvatskoj slijedi normalnu raspodjelu
- prosječna visina je 172 cm, a standardna devijacija je 4 cm.

Kolika je vjerojatnost da potpuno slučajnim izborom odaberemo studenta čija visina je 164-180 cm?



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

Vjerojatnost da potpuno slučajnim izborom odaberemo studenta koji je visok 164-180 cm je:



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

Primjer:



Pretpostavke:


- visina studenata 1. godine u Hrvatskoj slijedi normalnu raspodjelu
- prosječna visina je 172 cm, a standardna devijacija je 4 cm.

Kolika je vjerojatnost da potpuno slučajnim izborom odaberemo studenta nižeg od 160 cm?



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

Vjerojatnost da potpuno slučajnim izborom odaberemo studenta koji je visok 164-180 cm je:




Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

Standardna pogreška







Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

POPULACIJA - UZORAK




Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika



O ČEMU OVISI TOČNOST PROCJENE ARITMETIČKE SREDINE POPULACIJE?

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika



PAZITI !!!



SD $\neq$ SEM

mjera varijabilnosti
uzorka

ne opisuje uzorak

nego

je mjera preciznosti
procjene aritmetičke
sredine




Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

Interval pouzdanosti
Confidence interval (CI)




Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

KAKO NASTAJE INTERVAL POUZDANOSTI



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

95 % CI $\Rightarrow$ aritmetička sredina $\pm$ 1.96 SEM



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

Primjer:



Pretpostavke:

- slučajnim ste izborom uzeli 30 studenata 1. godine i odredili prosječnu visinu (170 cm).
- SD = 15 cm

Procijenite s 95 % -tnom pouzdanosti kolika je prosječna visina studenata 1. godine u Zagrebu.



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika

- aritmetička sredina = 170 cm, SD = 15 cm, N = 30

95 % CI = ?


$$SEM = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \frac{15}{\sqrt{30}} = 2,7$$

95 % CI $\Rightarrow$ 170 $\pm$ 1.96 $\times$ 2,7

95 % CI $\Rightarrow$ 164,7 - 175,3



Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika





Primjer:

Pretpostavke:

- slučajnim ste izborom uzeli 300 studenata 1. godine i odredili prosječnu visinu (170 cm).
- SD = 15 cm

Procijenite s 95 %-tnom pouzdanosti kolika je prosječna visina studenata 1. godine u Zagrebu.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika




Primjer:

Pretpostavke:

- slučajnim ste izborom uzeli 30 studenata 1. godine i odredili prosječnu visinu (170 cm).
- SD = 1.5 cm

Procijenite s 95 %-tnom pouzdanosti kolika je prosječna visina studenata 1. godine u Zagrebu.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biostatistika



Kako SEM ovisi o N i SD ?

N	SD	SEM	$\pm 1,96 \text{ SEM}$
30	15	2,7	10
300	15	0,86	3,4
3000	15	0,27	1
30	1,5	0,27	1



OSTALI INTERVALI POUZDANOSTI

razina pouzdanosti	broj s kojim množimo SEM
90 %	1,65
95 %	1,96
99 %	2,58
99,9 %	3,291



PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA



1. Kako glasi centralni granični teorem?
2. Kako ovisi raspodjela aritmetičkih sredina uzoraka o veličini uzorka?
3. Što znače simboli $\bar{x}$ i μ ?
4. Što je standardna pogreška aritmetičke sredine (SEM)?
5. U kakvom su odnosu SEM i veličina uzorka?
6. U kakvom su odnosu SEM i standardna devijacija?
7. Što je interval pouzdanosti (CI)?
8. U kakvom su odnosu CI i veličina uzorka?
9. U kakvom su odnosu CI i standardna devijacija?
10. Koji CI se najčešće koristi u literaturi?

